

**Алгоритм действий медицинских работников,  
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  
в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными  
инфекциями.**

N груп пы	Типовые случаи	Тактика ведения
1.	<p>Контактный.</p> <p>Был контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Симптомы острой респираторной вирусной инфекции &lt;1&gt; отсутствуют.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- оформление листка нетрудоспособности на 14 дней;</li><li>- изоляция на дому на 14 дней;</li><li>- в случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом;</li><li>- забор мазка из носо- и ротоглотки в день обращения с первичным осмотром врача (в кратчайшие сроки), при появлении клинических симптомов ОРВИ - немедленно.</li></ul>
2.	<p>ОРВИ легкого течения (за исключением ОРВИ легкого течения у пациента из группы риска).</p> <p>Наличие 2-х критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- уровень насыщения крови кислородом <math>\geq 95\%</math> (обязательный критерий);</li><li>- температура тела <math>&lt; 38\text{ }^{\circ}\text{C}</math>;</li><li>- частота дыхательных движений <math>\leq 22</math>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- забор мазка из носо- и ротоглотки в день обращения с первичным осмотром врача;</li><li>- оформление листка нетрудоспособности на 14 дней.</li><li>- изоляция на дому на 14 дней;</li><li>- ежедневный аудиоконтроль состояния, повторное посещение врача в случае ухудшения состояния пациента;</li><li>- забор контрольного мазка из носо- и ротоглотки (с 10 по 14 день дважды - в подтвержденном случае COVID-19);</li><li>- выписка в соответствии с порядком выписки (перевода) из медицинской организации и критериями выздоровления пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 согласно приложению N 13 к настоящему приказу.</li></ul>

3.	<p>ОРВИ легкого течения у пациента, относящегося к группе риска (лица старше 65 лет, лица с наличием хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, системными заболеваниями соединительной ткани, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитами, циррозом печени, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника).</p> <p>Наличие 2-х критериев:  - <math>SpO_2 \geq 95\%</math> (обязательный критерий);  - <math>T &lt; 38\text{ }^\circ\text{C}</math>;  - <math>ЧДД \leq 22</math>.</p>	<p>- госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи.</p>
4.	<p>ОРВИ среднетяжелого или тяжелого течения.</p> <p>Наличие 2-х критериев:  - <math>SpO_2 &lt; 95\%</math> (обязательный критерий);  - <math>T \geq 38\text{ }^\circ\text{C}</math>;  - <math>ЧДД &gt; 22</math>.</p>	<p>- госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи.</p>